

金

匱

翼

金匱翼卷三目錄

膈噎反胃統論

痰膈 血膈 氣膈 疝膈 梅核膈氣

雜療方

虛勞統論

營衛不足 肺勞 心勞 腎勞 脾勞

風勞 熱勞 乾血勞 傳尸勞

發熱統論

勞倦 火鬱 血虛 陽浮 痰積 瘀血

骨蒸 食積酒毒發熱 藏府血氣分治

惡寒

瘧疾統論

風瘧 溫瘧 溼瘧 癰瘧 牡瘧 痰瘧

食瘧 虛瘧 瘵瘧

金匱翼卷三

飼鶴山人

長洲後學徐錦炳南氏讀

膈噎反胃統論

膈隔也。飲食入咽，不得輒下。噎塞膈中，如有阻隔之者，故名曰膈噎。又其病正在膈間，食不得下，氣反上逆，隨復吐出，故又名膈氣反胃者。飲食入胃，全無阻隔，過一二時，輒復吐出，有反還之意，故曰反胃。甚者朝食暮吐，暮食朝吐，有翻傾之義，故亦名翻胃。不似

噎隔之噎然後吐不噎則不吐也

噎膈之病有虛有實實者或痰或血附着胃脘與氣相搏翳膜外裹或復吐出膈氣暫寬旋復如初虛者津枯不澤氣少不充胃脘乾癢食澁不下虛則潤養實則疏瀹不可不辨也

飲食下咽不得入胃爲噎食不下通氣反上逆爲塞東垣乃謂陽氣不得出者爲寒陰氣不得降者爲噎豈非謂入食從陰而氣出從陽耶其文則深其旨反晦至謂先用陽藥治本後用堵塞瀉標吾不知其何

所謂矣

子和論膈噎累累數百言。謂三陽結熱前後閼滯。下
既不通。必反上行。所以噎食不下。夫膈噎。胃病也。始
先未必燥結。久之乃有大便秘少。若羊矢之證。此因
胃中津氣上逆。不得下行而然。乃胃病及腸。非腸病
及胃也。又因河間三乙承氣之治。謂噎膈之病。惟宜
川下。結散陽消。其疾自愈。夫腕膈之病。豈下可去。雖
仲景有大黃甘草東垣有通幽潤腸等法。爲便秘嘔
吐者立。然自是食入輒吐之治。非所論于食噎不下

也。獨其所謂慎勿頓攻。宜先潤養。小著湯丸。累累加
用。關扃自透。或用苦酸微湧。膈涎因而治下。藥勢易
行。設或不行。蜜苦鹽下道。始終勾引。兩藥相通者。其言
甚善。蓋痰血在腕不行不愈。而藥過病所。反傷真氣。
非徒無益矣。故以小丸累加。適至病所。無過不及。以
平爲期。則治噎之道也。但須審是痰是血而行之耳。
膈噎之證。大都年踰五十者。是津液枯槁者居多。
若壯年氣盛。非血卽痰。近見有津液枯槁之劑。治
一少年肥實男子。至死不悟。哀哉。鶴年

先嬌傳一方云。用燒酒一斤。浸海蜚花頭一斤。入
磁瓶內埋地數年。則海蜚化爲水矣。取飲半酒杯
妙。鶴年又識

痰膈

痰膈因七情傷于脾胃。鬱而生痰。痰與氣搏。升而不
降。遂成噎膈。其病令人胸膈痞悶。飲食輒噎。不得下
入胃中。必反上逆而嘔。與痰俱出。治法宜調陰陽。化
痰下氣。陰陽平均。氣順痰下。病斯已矣。

和劑四七湯 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰

涎狀如破絮。或如梅核。在咽喉之間。咯不出。嚥

不下。此七情所為也。中脘痞悶。氣不舒快。或痰飲嘔逆。惡心。並皆治之。

半夏製二錢 茯苓一錢六分 紫蘇葉入分 厚朴薑製一錢二分

水一盞。生薑七片。紅棗二枚。煎至八分。不拘時服。

服

丁沉透膈湯 和劑 治脾胃不和。痰逆惡心。或時嘔吐。

飲食不進。十膈五噎。痞塞不通。並皆治之。

人參 砂仁 香附各一兩 青皮

木香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香各半兩

陳皮

藿香

沉香

厚朴

各十錢五分

草薺

半夏

神麴

各二錢五分

麥芽

五錢

白朮

二兩

每服四錢水一盞薑三片棗一枚不拘時熱服

滌痰丸

半夏麴

桔礬

皂角

炙刮去皮弦子元明粉

白茯苓

枳殼

各等分

右爲末霞天膏和丸量人虛實用之

血膈

丹溪治一少年。食後必吐出數口。却不盡出。膈上時作聲。面色如平人。病不在脾胃。而在膈間。其得病之由。乃因大怒未止。輒食麪。故有此證。想其怒甚。則血菀于上。積在膈間。礙氣升降。津液因聚。爲痰爲飲。與血相搏而動。故作聲也。用二陳加香附。韭汁。蘿蔔子。二日。以瓜蒂散。敗醬吐之。再一日。又吐痰。中見血一盞。次日復吐。見血一鍾而愈。

一中年人。中脘作痛。食已乃吐。面紫霜色。兩關脉瀼。乃血病也。因跌仆後。中脘卽痛。投以生新血。推陳血。

之劑吐血片碗許而愈

一中年婦人反胃以四物加帶白陳皮留尖去皮桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢屎以防生虫與數十貼而安

一人咽膈間常覺有物閉悶飲食妨礙脉瀉稍沉形色如常以飲熱酒所致遂用生薑汁每服半盞日三服至二斤而愈

一人食必屈曲下膈梗澁微痛脉右甚瀉而關沉左却和此汚血在胃脘之口氣因鬱而爲痰必食物所

致詢其去臘日飲胡剝酒三盞遂以生韭汁冷飲細呷之盡半斤而愈

一貧叟病噎膈食入卽吐胸中刺痛或令取韭汁入鹽梅滿汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈此亦仲景治胸痺用薤白取其辛溫能散胃脘痰涎惡血之義也愚謂此不獨辛溫散結之義蓋亦鹹能潤下而酸味最能開膈胃止嘔吐品味不雜而意旨周密殊可取也

一婦年及五十身材畧瘦小勤于女工得噎膈證半

年矣飲食絕不進。而大便燥結不行者十數日。小腹
隱隱然疼痛。六脉皆沉伏。以生桃仁七箇。令細嚼。杵
生韭汁一盞送下。片時許。病者云。胸中畧覺寬舒。以
四物六錢。加括蕪仁一錢。桃仁泥半錢。酒蒸大黃一
錢。酒紅花一分。煎成止藥一錢。取新溫羊乳汁一錢。
合而服之。半日後。下宿糞若干。明日腹中痛止。漸可
進稀粥而少安。後以四物出入加減。合羊乳汁服五
六十貼而安。

江應宿治一老婦年近七旬。患噎膈。胃脘乾燥。屬血

虛有熱投五汁湯二十餘日而愈其方蘆根汁藕汁
甘蔗汁牛羊乳生薑汁少許餘各半錢重湯煮溫不
拘時徐徐服。

滋血潤腸湯 治血枯及死血在膈飲食不下大

便燥結

當歸

酒洗三錢

芍藥

煨

生地黄

各一錢半

紅花

酒洗

桃仁

去皮尖炒

大黃

酒煨

枳殼

麩炒各一錢

水一鍾半煎七分入韭菜汁半酒盞食前服。

秦川剪紅丸

良方

雄黃另研 木香各五錢 枳榔 三稜煨

蓬朮煨 貫仲去毛 乾漆炒烟盡 陳皮各一兩

大黃一兩半

右麪和丸梧子大每五十九食前米飲送下吐
出瘀血及下虫為效。

氣膈

氣膈病使人煩懣食不下時嘔沫淳于意作下氣湯
治此疾一日氣下二日能食三日愈然下氣湯方不
傳。

一村夫因食新笋羹。噯納間忽爲一噎。延及一年。百藥不效。王中陽乃以葦撥麥芽炒青皮去穰人參苦桔梗柴胡白朮南木香高良薑半夏麩共爲末。每服一錢水煎熱服。次日病家報云。病者昨已痛極。自己津唾亦嚥不下。服藥幸納之。胸中沸然。作聲覺有生。意。敢求前劑。況數日不食。特將氣未盡。擬待就木。今得此藥。可謂還魂散也。王遂令其搗碎米煮粥。將熟卽入藥再煎一沸。令啜之一吸而盡。連服數劑。得回生。因名曰還魂散。後以之治七情致病吐逆不定。面

黑目黃目漸瘦損傳爲噎證者多驗但忌油膩魚腥
粘滑等物

承類鈴方治噎膈不食黃犬乾餓數日用生粟或米
乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握
泡熟去薤入沉香末二錢食之。

救急療氣噎方

半夏

柴胡

各三兩

生薑

三兩

羚羊角

犀角

桔梗

昆布

通草

炙甘草

各二兩

水八升煮三升分三服

療因食卽噎塞如炙嚮在膈不下方。

射干 六分 升麻 四分 桔梗 四分 木通 一錢

赤苓 八分 百合 八分 紫苑頭 二十枚

水二大升煎九合去渣分溫三服食遠。

重膈

張文仲備急方言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極效遂服二合後食只吐一半哺時再服二合食粥

便定。次日奏知宮中五六人患反胃者同服。一時俱
瘥。此物稍有毒。服之不可過多。須熱飲之。病深者七
日當效。後用屢驗。

廣五行記。永徽中絳州有僧病噎數年。臨死遺言。令
破喉視之。得一物似魚而有兩頭。遍體悉是肉鱗。致
鉢中跳躍不止。以請味投鉢。悉爲水。時寺中刈藍作
靛。試取少許置鉢中。虫繞鉢。畏避須臾。虫化爲水。後
人以靛治噎疾。每效。

治梅核膈氣方

取半青半黃梅子。每個用鹽一兩淹一日夜晒乾。又浸又晒至水盡乃止。用青錢三個夾二梅。麻線縛定。通裝磁罐內封埋地下。百日取出。每用一梅含之。嚥汁入喉。卽消。收一年者治一人。收二年者治二人。其妙絕倫。

昆布丸 治五噎咽喉妨塞。食飲不下。

昆布 洗

麥門冬

天門冬

並去心焙

訶黎勒

去核各一兩五錢

木通

川大黃

微炒

川朴硝

郁李仁

湯浸去皮微炒

桂心

百合

各一兩

羚羊角屑 杏仁去皮尖 蘇子微炒 射干各五錢

柴胡去蘆 陳皮去白 檳榔各二錢半

右爲細末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧子大。每服

三十丸。不拘時。熱酒送下。夜飯後。用綿裹彈子

大一丸。嚙化。

雜療方

普濟方云。反胃吐食。藥物不下。結腸三五日。至七八日。大便不通。如此者必死。昔金州周禪師。得正胃散方于異人。十痊八九。君子收之。可濟人命。用白水牛

喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片臨時
旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋
盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收
遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效
集驗療反胃朝食暮吐暮食朝吐方

羊肉去脂膜作脯以好蒜齏空腹任意食之立
見效驗

聖濟總錄治咽喉妨礙如有物吞吐不利方

杵頭糠

人參

各一錢

石蓮肉

炒二錢

水煎服日三次

虛勞統論

虛勞一曰虛損蓋積勞成虛積虛成弱積弱成損也
虛者空虛之謂損者破散之謂虛猶可補損則罕有
復完者矣

古有五勞五蒸六極七傷之名而不一其說然五勞
者主五藏心勞肝勞脾勞肺勞腎勞是也五蒸者主
軀體膚蒸肉蒸脈蒸筋蒸骨蒸也六極者氣極血極
筋極肌極精極骨極合內外兼陰陽者也七傷者大
飽傷脾大怒氣逆傷肝強力舉重久坐溼地傷腎形

寒飲冷傷肺。憂愁思慮傷心。大恐懼不節傷志。風雨寒暑傷形。合形藏神而言者也。外此所謂志勞憂勞瘦勞思勞及陰寒陰痿裏急精速等證爲七傷者皆非也。

損證有自上至下者。有自下至上者。而皆以中氣爲主。故難經一損損于肺。皮聚而毛落。二損損于心。血脈虛弱。不能榮于藏腑。婦人則月水不通。三損損于胃。飲食不爲肌膚。此自上而下者也。一損損于腎。骨痿不能起于牀。二損損于肝。筋緩不能自收持。三損

損于脾。飲食不能消克。此自下而上者也。機要云。虛損之疾。寒熱因虛而感也。感寒則損陽。故損自上而下。治之宜以辛甘淡。過于胃則不可治也。感熱則損陰。故損自下而上。治之宜以苦酸鹹。過于脾則不可治也。夫脾胃居中而運水穀。脾胃氣盛。四藏雖虛。猶能溉之。不然則四藏俱失其養矣。得不殆乎。故曰過于脾胃者不治。

治損之法。莫善于難經。謂損其肺者益其氣。損其心者調其營衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝

者緩其中。損其腎者益其精。蓋肺主氣。益之使充也。心主血。而營衛者血之源。和之使無偏也。脾運水穀。而主肌肉。調之適之。毋困其內。亦无傷其外也。肝苦急。緩之使疎達也。腎主精。益之使不匱也。後人不辨。損在何藏。槩與養陰清火術亦疎矣。

陳藏器諸虛用藥凡例。本出千金。此在初學。殊足以爲準則。若夫得心應手。神明變化。端不在此區區形迹間也。

虛勞營衛不足

虛勞營衛不足者。脈極虛。乳遲。短氣。裏急。四肢痠疼。腹中痛。或悸。或衄。或手足煩熱。咽乾。口燥。宜甘酸辛藥調之。甘以緩急。酸以養陰。辛以養陽也。

小建中湯方

白芍 六兩

甘草

桂枝

生薑

各三兩

大棗

十二枚 膠飴 一升

虛甚者加黃耆

一兩半

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。深師治虛勞。腹滿。

食少泄瀉者。無膠飴。有人參二兩。半夏一升。

必效方治虛勞失精。加龍骨白欵各一兩。古
今錄驗治虛勞裏急。小腹急痛。氣引胸脇。或心
痛短氣。以乾薑代生薑。加當歸四兩。

經云。肝生于左。肺藏于右。心位在上。腎處在下。脾居
四臟之中。生育營衛。通行津液。一有不調。則失所有
所行矣。必以此湯溫健中臟。故名建中。中藏者。脾胃
也。脾欲緩。急食甘以緩之。故以飴糖爲君。甘草爲臣。
桂枝辛熱散也。潤也。營衛不足。潤而散之。芍藥酸寒。
收也。泄也。津液不足。收而行之。故以芍桂爲佐。生薑

辛熱大棗甘溫胃者衛之源脾者榮之本衛不足益之必以辛榮不足補之必以甘甘辛相合脾胃健而榮衛通故以薑棗爲使也

一 大建中湯方 治內虛裏結少氣手足厥冷小腹攣急或腹滿弦急不能食起卽微汗陰縮或腹中寒痛或唇口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢失精

黃耆

當歸

桂心

芍藥

錢各二

人參

甘草

各一

半夏

黑附子

炮各二錢半

每服五錢。水二觔。薑三片。棗二枚。煎一觔。去滓。食前溫服。本方加白朮。菴蓉。麥冬。川芎。熟地。

茯苓。名十四味。建中湯。皆補益榮衛之劑也。

炙甘草湯 治虛勞不足。汗出而悶。脈結悸。行動

如常。不出百日。危急者十一日死。

炙甘草 四兩 桂枝 各三兩 生薑 各三兩 麥冬 去心

麻仁 各半升 人參 各二兩 阿膠 各二兩 大棗 二十枚

生地黃 一斤

右九味。以酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去

萍。內膠消盡。溫服一升。日三服。

朱雀湯 治勞傷心氣變生諸疾。

雄雀一隻取肉炙 赤小豆一合 人參 赤苓

紫石英 小麥 大棗肉各一兩

紫苑 遠志 丹參各半兩

炙甘草二錢半

右細剉拌勻每服三錢。用水一瓊煎六分去滓。

食遠溫服。奇效方

肺勞

肺勞者。呼吸少氣。咳嗽喘急。喘乾。氣極則皮毛焦乾。津枯力乏。腹脹喘鳴。由預事而憂。或風邪久住而成。宜分邪正冷熱而治之。

紫苑湯 治氣極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣不足。以息。

紫苑茸

洗 乾薑 炮

黃耆

人參

五味子

鐘乳粉

杏仁

麩炒

甘草

炙各等分

右以咀每服四錢水一椀薑三片棗一枚煎服

無時

葛可久保利湯 治風寒久嗽成勞及肺燥成痰
者服之決效

知母 貝母 天冬 麥冬

款冬 各三錢 花粉 薏仁 杏仁 炒去皮尖各二錢

粉草 炙 紫苑 五味子 馬兜鈴

百合 桔梗 各一錢 阿膠 生地黃

當歸 紫蘇 薄荷 各五分 生薑 三片

右水煎入飴糖一匙服三日三服食後進。

一方無地黃有百部。若血盛加蒲黃茜根藕

節大薊茅花根。痰盛如半夏橘紅茯苓枳實

括萋炒喘盛加桑白皮陳葶子蘇子熱

盛加山梔炒黑黃連黃芩連翹。風熱加防風

金沸草甘菊花。寒盛加桂枝五味子臘月加

乾薑。

心勞

心勞者恍惚驚悸少顏色熱則煩心口乾溺澀寒則
內慄。夢多恐怖。由曲運神機而成熱則清之寒則溫
之養血安神則一也。

遠志引子 治心勞虛寒。夢寐驚悸。

遠志 去心 茯神 去木 肉桂 人參

棗仁 炒 黃耆 當歸 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢。水一瓊薑五片煎服無時。

麥門冬湯 治心勞虛熱。唇口赤。煩渴溺澀。

麥門冬 去心 遠志 甘草煮 人參 黃芩

生地黃 茯神 石膏 煨各一兩 甘草 炙半兩

煎服法同前。

腎勞

全圖 卷三
腎勞之證。面黑足冷。耳聾膝軟。腰痛。少腹拘急。小便不利。八味腎氣丸主之。此爲腎藏不足。內生寒冷。王太僕所謂腎虛則寒。動于中也。

八味腎氣丸方

熟地黃八兩 萸肉

山藥各四兩 牡丹皮

建澤瀉

白茯苓

各三兩

附子

製

肉桂

各一兩

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。每服七八十丸。空心

滾湯下。

本方加五味子。鹿茸。名十補丸。本

方去附子。加五味子二兩。名加減八味丸。

薯蕷丸 補丈夫一切病不能具述方。

薯蕷 枸杞子 續斷 茯苓

牛膝 兔絲子 巴戟 杜仲各一兩

菴蓉二兩 五味子 山萸肉 蛇牀子各一兩

右為散酒調方寸匕日三夜二禁醋蒜。

治腎勞精敗面黑方。

肉菴蓉四兩水煮令爛薄細切研精羊肉分為

四度下五味以米煮粥空心食聖濟總錄

許學士本事方唐鄭相國云予為南海節度使時年

七十有五粵地卑溼傷于內外衆疾俱作陽氣衰絕
乳石補益之藥一切不應元和七年有訶陵國舶主
獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十
年二月罷郡歸京錄方傳之其方用破故紙十兩揀
洗爲末用胡桃肉去皮十二兩研如泥卽入前藥末
更以好煉蜜和勻如餡盛瓷器中旦日以溫酒化藥
一匙服之不飲酒溫熟水化下彌久則延年益氣悅
心明目補益筋骨但禁食芸薹羊血蓄人呼爲補骨
脂丸

脾勞

脾勞之證。食不化。心腹痞滿嘔吐吞酸。面色痿黃甚者。心腹常痛。大便泄利。手足逆冷。骨節痠疼。日漸消瘦。由脾胃久積風冷之氣所致。亦名冷勞。木香猪肚丸主之。

木香猪肚丸方

木香

附子

郁李仁

乾薑

陳皮

麥冬

各一兩

肉豆蔻

一兩

熟艾

鱉甲

柴胡

神麴

各二兩

厚朴

薑水炒三兩

鍾乳粉

桂心

各五錢

共末用雄猪肚一具去脂膜切細入好米醋三升煮爛研細入末搗和龙梧子大空心温酒米飲任下二十九

千金治虛補勞方

羊肚

一具切

白朮

一升

右二味以水二斗煮取六升每服二升日三

又方

猪肚

一具

人參

五兩

蜀椒

乾薑

各二兩半

葱白 七兩
白梁米 半升

右六味。以咀諸藥。令相得。和米內肚中。縫合。勿令泄氣。取四斗半水。緩火煮爛。空腹食之。大佳。兼下少飯。

濟生白朮湯 治脾勞虛寒。嘔吐不食。腹痛泄瀉。胸滿善噫。

人參 白朮 草菓 肉豆蔻 麩裏煨

厚朴 陳皮 木香 麥芽 各一兩

炙草 半兩

每服四錢水一瓊薑五片棗一枚煎服無時

風勞

風勞之證。肌骨蒸熱寒熱往來痰嗽盜汗黃瘦毛焦口鼻或成疳利由風邪淹滯經絡瘀鬱而然其病多著于肝亦名肝勞。

寶鑑秦艽鱉甲散

鱉甲

一兩醋炙

柴胡

地骨皮

秦艽

知母

當歸各半兩

右為粗末每服半兩水一瓊入烏梅一枚青蒿

五葉同煎至七分去滓溫服臨臥空心各一服
如嗽多可加阿膠麥冬五味 元戎有桃柳枝
各七個蠶三片爲柴胡鱉甲散大便硬者服之
大便溏者半氣半血服逍遙散 元珠云體虛
之人最易感于邪氣當先和解微汗微利之從
其性而治之次則調之醫者不知邪氣加于身
而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡往往至
死不可不知也

柴胡飲子 太無

人參 黃芩 炙草 大黃

芍藥 柴胡 當歸 各半兩

每服四錢水薑煎溫服

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦盜汗肌熱口臭

婦人血風攻疰四肢 方見發熱門

良方團魚丸 治骨蒸勞嗽累效

貝母 前胡 知母 杏仁 各一兩

柴胡 半兩

用團魚二個同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾

爲耒再以鱖魚骨甲煮汁一瓊和藥丸梧子大
每服二三十丸煎黃耆六一湯空心送下病既
安仍服黃芪六一湯方調理

廣濟療骨蒸肺熱每至日晚卽惡寒壯熱頰色微赤
不能下食日漸羸瘦方。

生地黄三兩切葱白一把香豉二兩炙甘草五錢

童子小便二升

右五味以地黄等於小便中浸一宿平晨煎兩
沸絞去滓澄取一升二合分溫二服相去如人

行七八里服一劑差止

直指全鱉丸 此與良方團魚丸治同。

知母

貝母

杏仁

浸去皮
各三兩

柴胡

二兩

川芎 一兩

當歸

明阿膠

炒酥各
半兩

右纚截入厚磁器中用中等活鱉一個生宰去頭以鱉肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿密紙封次早慢火同煮香熟令病者隨意食之只留鱉甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米粉為糊丸桐子大每七十丸米飲下。

傷寒餘熱未盡或失于調攝致欬嗽寒熱吐血衄
血纏綿日久狀如勞瘵此皆元氣虛邪氣留著例
用養氣生血藥兼小柴胡青蒿鱉甲或前胡犀角
石羔等隨證加減無有不愈者切不可純用補劑
亦不可誤認爲虛損勞怯輕用杜仲熟地山萸等
溫補之藥也

熱勞

熱勞者因虛生熱因熱而轉虛也其證心神煩躁面
赤唇焦身熱氣短或口舌生瘡是也明醫雜著云人

之一身。陽常有餘。陰常不足。况節慾者少。過慾者多。精血既虧。相火必旺。火旺則陰愈消。而勞瘵咳嗽咯血吐血等證見矣。故宜常補其陰。使陰與陽齊。則水能制火。而水升火降。斯無病矣。

補陰丸方

黃柏去皮酒炒 知母去皮毛酒炒 龜板酥炙透 枳子

鎖陽酥炙 白芍酒炒 天冬去心各二兩 熟地酒蒸五兩

五味一兩 乾薑炒紫色三錢 冬川五錢

右為末。入煉蜜及猪脊髓三條。和勻杵丸。桐子

大每服八九十九空。心淡鹽湯送下。寒月可用
溫酒下。丹溪原方有陳皮半膝當歸虎骨無杞
子。天冬。五味。乾薑用酒煮羊肉爲丸。

瓊玉膏

生地黃 四斤 茯苓 十二兩 人參 六兩 白蜜 一斤

右先將生地黃熬汁去滓。入蜜煉稠。再將參苓
細末和入磁罐封水。煮半日。白湯化服。 臞仙
加琥珀。沉香各五錢。

按虛勞之人氣血多有鬱聚之處。故雖形衰氣少。而

脇下迫寒，不得左右臥者，虛中有實也。臞仙于滋補之中，寓通行之意。如張僧繇畫龍，一經點睛，通體皆靈。而用之者，往往獲效，是豈徒參地苓蜜之力哉。

大造丸

紫河車

一具米泔洗淨少加酒蒸極爛以山藥末搗和焙乾

收龜板

酥炙一兩

天冬

各一兩

熟地

二兩

夏加五味七錢

右除熟地另杵外，共為末，用酒煮米糊同熟地

搗膏丸。桐子大，或蜜丸，亦可。每服八九十九空。

心臨臥鹽湯下。冬月酒下。婦人去龜板加當歸

二兩

大補天丸 治男婦虛損勞傷形體羸瘦腰背疼

痛遺精帶濁。

紫河車 初胎者一具米泔浸淨入小砂罐內加水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍

用紙糊密末 知母 乳炒 龜板 酥炙各三兩 黃柏 蜜炙三兩

熟地 五兩 肉蓯蓉 牛膝 麥冬

山藥 炒 虎脛骨 酥炙 黃耆 蜜炙 茯神 各一兩半

杜仲 何首烏 人參 白芍 各一兩

枸杞二兩 生地酒洗 天冬 當歸

北五味各一兩

冬加乾薑半兩炒焦

右為細末。用猪脊髓三條蒸熟。加煉蜜和搗為丸。桐子大。每服八十九。空心淡鹽湯下。冬月酒下。

治骨蒸便澹口渴者方。

青蒿 烏梅 秦朮 甘草

小麥

水煎服

草還丹 治陰虛骨蒸。

青蒿

一斗
五升童便 三斗

文武火熬。約童便減至二斗。去青蒿再煎至一升。入猪膽七個。再熬數沸。用甘草末收和為丸。梧子大。每服五十九。

又方

鮮地骨皮

三錢

紅棗

七枚

煎湯代茶。日一劑。

治骨蒸神效。若治童勞加燕窩

一錢

鶴年

黃耆鱉甲煎 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晡潮熱夜有

盜汗胸脇不利減食多濁欬唾稠粘時有膿血

黃芪 知母 桑白皮 炙甘草

赤芍藥 紫苑 各五錢半 地骨皮 秦艽

白茯苓 生地 柴胡 各六錢六分 肉桂

人參 苦桔梗 各三錢三分 鱉甲 酥炙

天冬 各一兩 半夏 五錢

右為粗末每服三錢水一瓊煎至七分去滓食

後溫服一名人參黃芪散

乾血勞

乾血血瘀而乾也。瘀則生熱。內傷肝肺。發熱咳嗽。日以益甚。不已則成勞。金匱所謂經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑者是也。

天黃廬蟲丸

大黃二兩 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁

杏仁 廬蟲 蟬蛻各一升

芍藥 乾地黃 乾漆一兩 水蛭百枚

右爲末。蜜丸。小豆大。酒服五丸。日三服。

王念西云。虛勞發熱。未有不由瘀血者。而瘀血未有不由內傷者。人之起居飲食。一有失節。便能成傷。瘀積之血。牢不可拔。新生之血。不得周灌。與日俱積。其人尙有生理乎。仲景施活人手眼。以潤劑濡乾血。以蠕動啖血之物。行死血。死血既去。病根以剗。而後可從事于滋補矣。陳大夫百勞丸。可與此互用。

喻嘉言曰。此世俗所稱乾血勞之良治。血結在內。手足脈必相失。宜服此方。然必兼大補劑。瓊玉膏之類。

服之。按相失者不相得也。血結脈不通使然。

陳大夫百勞丸 治一切勞瘵積滯疾不經藥壞

者宜服。元丸

錦紋大黃去皮及黑 乳香 沒藥

當歸各一錢 人參 二錢 桃仁去皮尖另

靈壽 水蛭各十四枚炒

右為極細末。煉蜜丸。桐子大都作一服。可百丸

五更用百勞水下。取惡物為度。服白粥十日

按都作一服。服當作劑劑量也。量病之輕重而

製其大小也云取惡物爲度則非一服令盡可知。

傳尸勞

張雞峯云傳尸勞者緣尸疰及挾邪精鬼氣而成者也。大槩寒熱淋露沉沉默默不的知其所苦而無處不惡積年累月漸就委頓既死之後又復傳易他人者是也。茲須以通神明去惡氣諸藥治之。

一百一選方 治傳尸勞

天靈蓋

三錢酥炙黃爲末秤 鱉甲

極大者醋炙黃爲末稱一兩九勦者更妙

桃仁 一錢五分 去皮尖研 青蛇腦 小豆許 酥炙色轉 為度 無蛇腦亦得

虎糞內骨 安息香 半兩以上為末 絹篩篩過

檳榔 二錢半 別為細末 麝香 一錢 別研 青蒿 取近梢三四寸 細剉六兩

豉 三百粒 楓葉 二十片 葱根 二十一 個 拍破

童便 半升 桃柳李桑東引枝 各七莖 長七寸 如筋頭大 細剉

右先將青蒿桃李柳桑枝楓葉葱豉以官升量

水三升煎至半升去滓入安息香天靈蓋虎糞

內骨鱉甲桃仁童便同煎取汁去滓有四五合

將檳榔麝香同研均調作一服早晨溫服以被

覆出汗。恐汗內有細蟲。以帛拭之。即焚此帛。相
次須瀉。必有蟲下。如未死。以大火焚之。並棄長
流水內。所用藥。切不可令病人知之。日後亦然
十來日後。氣體復原。再進一服。

獾肝散

獾肝一具。陰乾。杵末。飲服。方寸七。日三。未愈再
服。肘後云。此方甚效。金匱

寶鑑紫河車丸

治傳尸勞。服三月必平復。其餘

勞證。須數服。神效。

紫河車

具川米泔水浸宿洗淨焙乾 鱉甲 酥炙

桔梗

去蘆

胡黃連

芍藥

大黃

收鼓皮心

醋炙

貝母 去心

龍膽草

黃蘗子

知母

各二錢半

芒硝

犀角

蓬朮

各一錢半

硃砂

研二錢

右爲細末。煉蜜丸如梧子大。硃砂爲衣。食前溫酒服二十九丸。如膈熱。食後服。重病不過一料。

發熱統論

有表而熱者謂之表熱。無表而熱者謂之裏熱。故苦以治五臟。五臟屬陰而居於內。辛者以治六腑。六腑屬陽而居于外。故曰內者下之。外者發之。

飲食勞倦爲內傷元氣。元氣傷則真陽下陷。內生虛熱。故東垣發補中益氣之論。用人參黃耆等甘溫之藥。大補其氣而提其下陷。此用氣藥以補氣之不足者也。勞心好色。內傷真陰。陰血旣傷。則陽氣偏勝。而變爲火矣。此謂陰虛火旺。勞瘵之症。故丹溪發陽有

餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其陰而火自降。此用血藥以補血之不足者也。益氣補陰皆內傷症也。一則因陽氣之下陷而升提之一則因陰火之上升而滋降之一升一降迥然不同矣。

節齋

平旦發熱熱在行陽之分。肺氣主之。故用白虎湯以瀉氣中之火。日晡潮熱熱在行陰之分。腎氣主之。故用地骨皮散以瀉血中之火。白虎湯治脈洪故抑之。使秋氣得以下降也。地骨皮散治脈弦故舉之。使春氣得以上升也。

治熱之法有五。一曰和。二曰取。三曰從。四曰折。五日
奪。假令小熱之病當以涼藥和之。和之不已。次用取
爲熱勢稍大。當以寒藥取之。取之不已。次用從爲熱勢
既甚。當以溫藥從之。謂藥氣溫也。味隨所爲。或以寒
因熱用。味通所用。或寒以溫用。或以汗發之不已。又
用折爲病勢極甚。當以逆制之。制之不已。當以下奪
之下奪之不已。又用屬爲求其屬以衰之。緣熱深陷
在骨髓。無法可出。針藥所不能及。故求屬以衰之。求
屬之法。是同聲相應。同氣相求之道也。如或又不已。

當廣求其法而治之。譬如孫子之用兵，在山谷則塞淵泉，在水陸則把渡口。在平川廣野當清野千里，塞淵泉者，刺俞穴，把渡口者，奪病發時前清野千里。如肌羸瘦弱，當廣服大藥以養正。

勞倦發熱

勞倦發熱者，積勞成倦，陽氣下陷，則虛熱內生也。其症身熱、心煩、頭痛、惡寒、懶言、惡食、脈洪大而空。狀類傷寒，切戒汗下。但服補中益氣湯一二服，得微汗則已。非正發汗，乃陰陽氣和，自然汗出也。

補中益氣湯

黃芪各錢半

人參

炙甘草

白朮土炒

陳皮

當歸各五分

升麻

柴胡各三分

右加薑三片。棗二枚水煎。本方加芍藥五味。

名調中益氣湯

火鬱發熱

火鬱者陽氣為外寒所遏不得宣行鬱而成火或因胃中過食冷物鬱遏陽氣于脾土之中令人心煩手足心熱骨髓中熱如火燎此為鬱熱經云火鬱則發

之

東垣火鬱湯

升麻

葛根

白芍藥

柴胡根

各一兩

防風

炙草

各五錢

右咬咀每服三四錢水二大瓊入連鬚葱白三

寸煎去滓稍熱服

血虛發熱

血虛發熱亦從勞倦得之東垣云飢困勞役之後肌熱煩躁困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉大虛按

之無力。經云脉虛則血虛。血虛則發熱。症象白虎。惟脉不長實為辨也。誤服白虎。旬日必變。

當歸補血湯

黃芪 一兩 當歸 二錢 生地黃 五錢 生草 一錢

右作一服。水煎溫服。食前。

陽浮發熱

陽氣虛浮。其端有二。或脾胃氣虛。陽浮于外。其症上見嘔惡。下為澹泄。其脉大而不實。身雖大熱。切忌寒涼。宜甘辛溫藥。溫其中。使土厚則火自斂也。或腎虛

火不歸經。游行于外。其症煩渴引飲。面赤舌刺唇黑。足心如烙。或冷如冰。其脉洪大無倫。按之微弱。宜八味腎氣丸之屬。導火下行也。

理中湯

八味腎氣丸

方見虛勞門

王肯堂云。相火寄于命門。命門者。男子以藏精。女子以繫胞。因嗜慾竭之火。無所附。故厥而上行。桂附與火同氣。而其味辛。能開腠理。致津液。通氣道。據其窟宅而招之。同氣相求。火必降下矣。且火從腎出者。是

水中之火也。火可以水折，而水中之火不可以水折。故巴蜀有火井焉。得水則熾，得火則熄。則桂附者，固治浮游相火正劑歟。

痰積發熱

積痰發熱者，其脉弦滑。其證胸膈痞塞，背心疼痛。活人書所謂中脘有痰，令人憎寒發熱，狀類傷寒，但頭不痛，項不強爲異。

瘀血作熱

瘀血發熱者，其脉澀。其人但漱水而不欲嚥，兩腳必

全日身 卷三
厥冷。少腹必結急。是不可以寒治。不可以辛散。但通其血。則發熱自止。

當歸承氣湯

當歸

大黃

各四錢

芫花

甘草

各二錢

右咬咀入葶煎。一方無芫花。有芍藥。名清涼飲子。

骨蒸熱

骨蒸熱者。熱伏于內。而氣蒸于外也。其證肌熱盜汗。黃瘦口臭。久而不愈。此骨蒸伏熱。營衛不通之所致。

也。少男室女多有此證。

麥煎散

方見虛勞門

柴胡梅連散

治骨蒸勞熱久而不愈。三服除根。

其效如神。

柴胡

人參

黃芩

甘草

胡黃連

當歸

芍藥

各半兩

右為末。每服三錢。童便一瓊。烏梅一個。猪胆五

匙。猪脊髓一條。菲根半錢。水一鍾。同煎至七分。

去滓溫服。無時。原方有前胡。無人參黃芩甘

草當歸芍藥。余蓋從柴胡飲子增入。以備補虛
瀉熱之用。去前胡者。不欲重散也。

食積酒毒發熱

食積者當暮發熱惡聞食臭時時噯腐其脈滑或實活人所謂傷食令人頭痛脈數發熱但左手人迎脈平和身不疼是也酒毒者脈數溺赤經云酒氣與穀氣相搏熱盛于中故熱遍于身內熱而溺赤是也。

加味越鞠丸

蒼朮

神麴

香附

黑山梔

撫芎

針砂

山查

右爲末糊丸。

酒煮黃連丸

黃連八兩。用酒二斗。入瓦罐內。重湯煮爛。取出
晒乾為末。滴水丸。桐子大。每五十丸。食前溫水
下。

分治藏府。上下血氣諸熱。

錢氏瀉青丸 治肝熱。

當歸焙 龍膽草 川芎 山梔

羌活 防風 大黃

右為末。蜜丸。雞頭子大。每服一九。一方彈子。

大竹葉湯化下一丸。

龍薺丸 治肝藏積熱

當歸 焙

龍膽草 梔子

黃連

黃柏

黃芩

各一錢

大黃

蘆薈

青黛

各半兩

木香

二錢半

麝香

五分別研

右爲末。煉蜜丸如小豆大。小兒如麻子大。每二

十九。生薑湯下。

外臺麥門冬飲 療心勞不止。口赤乾燥。心悶。肉

毛焦色。

生麥冬

一升 去心

陳粟米

一升

雞子白

二七枚

淡竹葉

三升 切

右先以水一斗。煮粟米竹葉取九升。去滓澄清。取七升。冷下雞子白攪五百轉。去上沫。下麥門冬。煮取三升。分三服。

濟生黃芩湯

治心熱。口瘡煩渴。小便不利。

生地

木通

甘草

黃連

黃芩

麥冬

梔仁

澤瀉

每服四錢。水一瓊。薑三片。煎服。無時。

瀉黃散 治脾熱口臭咽乾目黃

藿香葉 七錢 山梔 一兩 石羔 半兩 防風 四兩

甘草 二兩

右剉同蜜酒拌。微炒香為末。每服二錢。水一瓊。

煎清汁飲

外臺療脾熱方。

石羔 一斤碎 生地汁 一升 淡竹葉 切五升 赤蜜 一升

水一斗二升。煮竹葉取七升。去滓。內石羔煮取

一升五合。去滓。下地黃汁兩沸。下蜜煎取三升。

細細服。

瀉白散 治肺熱。

桑白皮

炒黃

地骨皮

各一兩

甘草

炙半兩

右為末。每服二三錢。水一盞。入粳米百粒煎。食

後服。易老加黃連。海藏云。加山梔黃芩方

能瀉之。

東垣滋腎丸 治腎熱。

黃柏

三兩

知母

二兩

桂

二錢半

右為末。熟水丸。桐子大。每七八十丸。...

前百沸湯下。

外臺三黃湯 治腎熱大小便闕塞耳鳴色黑。

大黃切別漬 黃芩 芒硝各三兩 梔子十四枚

甘草炙一兩

右以水四升先煮三物取一升五合去滓下大

黃更煎兩沸下芒硝分三服。

外臺梔子煎 治膽實熱精神不守。

梔子二十枚 甘竹茹一兩 香豉六合 大青

橘皮各一兩 赤蜜三合

分治諸熱

水六升煎取一升七合去滓下蜜更上微火煎兩沸分再服。

導赤散 治小腸實熱小便赤澀而渴。

生地黃 木通 甘草 各等分

右為末每服三錢水一瓊入竹葉七片同煎至五分食後溫服。丹溪云導赤散正小腸藥也。瀉白湯 治大腸實熱腹脹不通俠臍痛食不化口生瘡喘不能久立。

淡竹葉 黃芩 梔子仁 柏皮 炙各半兩

茯苓

芒硝

各一兩

生地黃

三兩

橘皮

半兩

右剉每四錢入薑棗煎空心服。

千金竹葉湯

治胃熱

竹葉

小麥

各一升

知母

石膏

各三兩

黃芩

茯苓

麥冬

各二兩

人參

一兩

生薑

五兩

括萎根

半夏

甘草

各一兩

右㕮咀以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內

諸藥煮取三升分三服老小分五服。

千金地黃煎

分治諸熱

聖

生地黄汁

四升

茯苓

知母

葳蕤

各四兩

括婁根

五兩

竹瀝

三合

生薑汁

白蜜

生麥冬汁

生地骨皮汁

各一升

石羔

八兩

右以水一斗二升。先煮諸藥取三升。去滓。下竹

瀝。生地黄麥冬汁。微火熬四五沸。下蜜薑汁。微

火煎取六升。初服四合。日三夜一。加至六合。夏

月作散服之。

東垣云發熱而不能食。自汗短氣者。虛也。以甘寒之

劑瀉熱補氣。能食而熱。口舌乾燥。大便難者。以辛苦

大寒之劑下之瀉熱補水當細分之不可槩論

涼膈散 治上焦積熱煩躁面赤頭昏咽痛喉痺

口瘡頰腫便溺閉赤譫妄睡臥不安一切風壅

新薄荷 連翹 黃芩 梔子

甘草 各兩半 大黃 芒硝 各半兩

右末每服二三錢竹葉七片蜜三匙煎食後服

與四物各半服能益血洩熱名雙和散本事加

赤芍乾葛治諸熱病累效 玉機云輕者宜桔

梗湯本方去硝黃加桔梗舟楫之品浮而上之

去膈中無形之熱且不犯下二焦也

八正散 治下焦積熱二便澀澀口渴咽乾舌瘡

血淋。

大黃

瞿麥

木通

滑石

扁蓄

車前子

山梔

甘草

各等分

右為末。每服二錢。入燈心。水煎服。

通膈丸

本

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如煙搶

上

人參

川黃連

茯苓

各三兩

硃砂

一分

真片腦 少許

右爲細末。研勻。煉蜜丸如梧子大。熱水下三五丸。日二三服。

四順清涼飲子 治血分熱

大黃 蒸 甘草 炙 當歸 芍藥 各等分

右咬咀。每服五錢。用水一瓊半。薄荷十葉。同煎至七分。去滓。溫服。潔古云。涼風至而草木實。清涼飲子。乃秋風撤熱之劑也。

海藏桔梗湯 治氣分熱

桔梗

連翹

山梔

薄荷

黃芩

甘草

各等分

右為粗末。竹葉白水煎溫服汗之熱服

惡寒

惡寒有陽虛陽鬱之異陽虛者宜補而溫之陽鬱者宜開發上焦以升陽明之氣丹溪所謂久病惡寒當用解鬱是也

桂枝加人參附子湯 治陽虛腠理不固惡寒自

汗其脈浮虛。

桂枝

白芍

各一兩半

甘草

炙一兩

附子

炮半個

人參

一兩半

每服五錢生薑三片棗一枚水煎服。

陽鬱治案

進士周年近四十。得惡寒證。服附子數百貼。而病益甚。脈弦而緩。遂以江茶入生薑汁香油些少調飲之。吐痰一升許。減大半。又與通聖散去麻黃硝黃。加當歸地黃百貼而安。

一女子惡寒。用苦參赤小豆各一錢爲末。壅水調飲之。吐痰甚多。繼用南星川芎蒼朮黃芩酒打麵爲丸服愈。元珠云。上焦不通。則陽氣抑遏。而皮膚分肉無以溫之。故寒慄。東垣升陽益胃湯。用升發之劑。開

發上焦以升陽明之氣出于表而溫之也丹溪吐出溼痰亦開發上焦使陽氣隨吐伸發出外而溫之也故寒慄皆愈二者乃陽鬱表寒之要

大建中湯 療中虛怯寒

黃芪 當歸 桂心 白芍 各二錢

人參 一錢 甘草 一錢 半夏 黑附 炮去皮各二錢半

右八味。咬咀。每服五錢。水二瓊。薑三片。棗二枚。煎至一瓊。去滓。食後溫服。

羅謙甫治僉院董誠彥。夏月勞役過甚。煩渴不止。極

飲瀆乳。又傷冷物。遂自利。腸鳴腹痛。四肢逆冷。冷汗自出口。鼻氣亦冷。六脈如蛛絲。時發昏憤。衆大醫議以葱熨臍下。又以四逆湯五兩。生薑二十片。連鬚葱白九莖。水三升。煮取一升。去滓涼服。至夜半氣溫身熱。思粥飲。至天明而愈。許魯齋先生聞知。嘆曰。病有輕重。方有大小。治有緩急。僉院之病。非大方從權急治。不能愈也。

昔有一婦人。惡寒特甚。盛暑亦必服皮衣數件。晝夜常坐臥牀褥。飲食如常。亦一無所苦。更名醫數

四。終莫能治，補瀉寒熱溫涼備嘗之矣。一醫以玉
屏風散大劑煎水，以大鍋令患者薰蒸半日許，汗
出得愈。鶴年識

瘧疾統論

少陽膽爲風木之府。瘧家寒熱之邪必歸少陽。是以瘧脈多弦。少陽居半表半裏之間。其氣從陽則熱從陰則寒也。瘧者金火交沴。故其病寒熱並作也。

氣分受邪。發于六陽時。血分受邪。發于六陰時。淺者每日一發。深者間日一發。極深者三日發也。淺者屬陽。陽性易動。故日行之氣觸著便發。深者屬陰。陰性常靜。故日行之氣屢觸而始發也。

瘧發時。雖大熱大渴。必以淡生薑湯。適寒溫飲之。若

恣飲冷水瓜菓脾胃轉傷邪氣不達綿延難愈

凡瘧疾多熱久而不解者其人必本陰虛法當益陰除熱非當歸鱉甲製首烏牛膝之屬不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛法當甘溫散邪非乾薑附子桂枝人參之屬不能已也

瘧邪在陽者其證多汗感而卽發邪不能留其留藏不去者惟陰邪耳陰邪不能作汗雖以汗藥發之亦不得惟甘潤和陰如當歸牛膝之屬多服久服自能出汗而解也

傷寒往來寒熱勞瘵寒熱如瘧傷食勞役脚氣疝氣
腫毒初起俱有寒熱陰虛證每日午後發熱惡寒至
晚亦得微汗而解脈弦而數但不大弦爲辨耳俱不
可誤認爲瘧也凡病寒熱有期者瘧也無期者諸病
也

凡瘧病自陰而漸陽自遲而漸早者由重而輕也自
早而漸遲自陽而漸陰者由輕而重也凡感邪極深
發愈晏而作愈遲者必使漸早漸遲方是佳兆故治
此疾者春夏爲易秋冬爲難

瘧邪必從汗出邪在陰者必汗出至足乃佳然非麻葛輩可發但開鬱通經其邪熱卽散而爲汗矣其虛者非參芪歸地則終不能得汗也

古稱風寒暑濕皆能成瘧然必客于營衛之舍然後成瘧不爾不成瘧也夫營之有舍猶人之有傳舍也營衛之氣日行一周。歷五臟六腑。十二經絡之界分。必其舍有邪。與日行之衛氣相遇。則病作。離則病休。故發作有時。與傷寒大異也。

俗有傷寒變瘧。瘧變傷寒之說。思謂傷寒變瘧者。本

是瘧邪因其氣特甚故一發而不卽止。迨汗出氣衰乃復返于舍而後日作。非傷寒能變瘧也。瘧變傷寒者本是傷寒。因邪氣先中少陽故寒熱如瘧其邪遞引遞出遍滿三陽之界因而發熱不止。設不解則又轉而之三陰。非瘧邪能變傷寒也。是以始先似瘧之證熱雖退身表尙有餘熱不似瘧之熱退卽涼也。始先似傷寒者汗常浹體而熱不退過一二日忽振寒而發熱或熱退一日而復作寒熱非如傷寒之汗出卽熱退而邪解也。學者智識旣具自當獨斷豈可習

焉不察自同衆人也。

久瘧不退。邪氣陷入陰分。虧損營血。有熱無寒。口燥唇乾。有似傷寒。人皆謂之變傷寒。不知其爲傳勞瘵也。脈將散大。或細數。而死期至矣。

風瘧

風瘧者。脈浮多汗。惡風多于春時得之。經云。以春病者。惡風是也。亦有發于秋者。經云。夏暑汗不出者。秋成風瘧是也。楊仁齋云。風瘧是感風而得。惡風自汗。煩燥頭疼。風陽氣也。故先熱後寒。可與解散風邪。

溫瘧

溫瘧者先熱而後寒與風瘧大畧則同其但熱而不寒者經所謂得之冬中于風寒氣藏于骨髓之中至春夏陽氣大發邪氣與汗皆出此病藏于腎其氣先從內出之于外也外臺云病瘧六七日但見熱者溫瘧也與夏傷暑而秋病瘧者不同又有先傷風而後傷寒者亦先熱而後寒名曰溫瘧與此亦不同

桂枝白虎湯

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

碎一升

桂枝

三兩

粳米 六合

右剉每服五錢水一瓊半煎至八分去滓溫服汗出即愈。

延年療溫瘧壯熱不能食知母鱉甲湯。

知母 鱉甲 炙 骨皮 各三兩 常山 二兩

竹葉 一升 石羔 四兩

水煎分三服

溼瘧

溼瘧者寒熱身重肢節煩疼服滿善嘔自汗陳無擇

云因汗出復浴。溼舍皮膚。及冒雨溼所致。當從太陽論治。除溼湯主之。寒多者。必兼溫。行陽氣也。

除溼湯

半夏

厚朴

蒼朮

米泔製 各二兩

白朮

生

藿香

橘紅

白茯苓

各一兩

甘草

炙七錢

右咬咀。每服四錢。薑七片。棗一枚。水煎。食前溫

服。本方去白朮。加人參。艸果水薑烏梅煎。即

和劑。人參養胃湯。脈無力。寒多。加薑附。脈有力

熱多。加芩連柴胡。朴蒼薑藿發散也。半果茯苓

橘劫痰也。人參惟虛人最宜。

痺瘧

痺單也。言獨熱而無寒也。經云陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰痺瘧。此以陽藏而病陽證與諸瘧證亦不同。其治之之法有三。一者熱氣內蓄而表有客寒則當散以辛涼。一者客邪已解而蘊熱獨盛則當清以苦寒。或甘寒。一者邪火雖盛而氣血已衰真陰已耗者急宜壯水固原也。

備急竹葉常山湯

治痺瘧及溫瘧。

常山 三兩 淡竹葉 一握 小麥 一升

水五升煮一宿明旦煮取二升分溫三服。

牡瘡

瘡多寒者名曰牡瘡。金匱云然也。然牡當作牝。傳寫之誤耳。衛州書云瘡多寒者痰多也。痰爲水類能遏絕其陽氣于裏使不得外達。故寒多不熱。雖熱亦不甚也。用蜀漆散者吐去其痰。陽氣一伸其疾自愈。夫牡屬陽。牝屬陰。寒多爲陰。故宜曰牝。

牡蠣湯

牡蠣

麻黃

各四兩

蜀漆

三兩

甘草

二兩

右先取蜀漆三過去腥水八升煮蜀漆麻黃等得六升去沫內餘藥煮取二升飲一升吐復飲之

痰癰

痰癰由夏月乘涼飲冷及臥溼地飢飽失時脾胃不和痰積中脘所致其脈弦滑其證胸痞嘔吐或時眩暈者是也微則消之甚而實者蜀漆常山之類攻而去之虛者四靨飲之屬補而去之

常山散

常山一兩剉碎。以好酒浸一宿。瓦器煮乾為末。每服二錢。水一盞煎半盞。去滓停冷。五更服之。不吐不瀉效。

四獸飲

半夏

茯苓

人參

艸果

陳皮

甘草

減半

烏梅肉

白朮

各等分

右咬咀。同薑棗等分。以鹽少許淹服。食頃厚皮紙裝煨令香熟。焙乾。每服半兩。水煎。未發前併

進三服。

食瘧

食瘧一名胃瘧。飲食無節，傷胃而成。其證腹痛中滿，不能食，食則嘔逆，噎腐吞酸，其脈氣口獨盛。戴復庵法：平胃散加艸果砂仁吞紅丸子。方並見食門

先醒齋筆記：梁溪王興甫，備食牛肉，覺不快，後遂發瘧。飲食漸減，至食不下咽，已而水飲亦不下。白湯過喉間，嘔出作碧色，藥不受，小便一滴如赤茶。大便閉，醫皆束手。仲淳忽至，視之，令仰臥，以指按

至心下。偏右大叫。因詢得其由。用丸藥一服。至喉
輒不嘔。水道漸通。次日下黑物數塊如鉄。其病如
失。丸藥用礬紅和平胃散作末。棗肉丸。白湯下三
錢。

虛瘧

虛瘧者。或體虛而病瘧。或因瘧而致虛。六脈微弱。神
氣倦怠。是以補養正氣爲主。經云瘧脈緩大。虛。便用
藥。不宜用針。蓋病瘧而脈虛。氣先餒矣。故不宜用針
而宜用藥。所謂陰陽形氣俱不足者。勿刺以針而調。

以甘藥也。

補中益氣湯 小建中湯

二方俱補虛散邪之劑。楊仁齋云：有中年人藏府久虛，大便常滑，忽得瘧疾，嘔吐異常，惟專用人參爲能止嘔。其他瘧藥並不可施，遂以二陳湯加人參、縮砂，倍用白豆蔻，一二服，病人因自覺氣脈頓平。於是寒熱不作。蓋白豆蔻能消能磨，流行三焦，營衛一轉，寒熱自平也。

新定人參烏梅散 治虛瘧久瘧，少氣不食，亦治

勞瘧。勞瘧者。遇勞卽發。經年不差者。是。

人參 三錢 烏梅 一枚 黃芪 當歸

茯苓 陳皮 各一錢 鱉甲 製首烏

白朮 各二錢

右都作一服加薑煎。

瘧瘧

瘧瘧者。老瘧也。三日一發。其氣深固。卒不得出。有累年不愈者。亦曰三陰瘧。大抵瘧病在三陽者。宜汗宜和。在三陰者。宜溫宜利。甚者非吐下不能拔其病根。

也其脇下有塊者名曰瘧母以鱉甲丸主之

千金常山丸

常山 三兩 鱉甲 二兩 知母 一兩 甘草 五錢

蜜丸梧子大未發前酒服十九丸臨發一服正發

又一服

鱉甲丸

鱉甲 各二兩 香附 各二兩 三稜 各一兩 蓬朮 各一兩

常山 一兩 阿魏 二錢

右並用醋浸神曲糊丸白湯下梧子大五十丸

積消及半卽止。

仁齋云瘧之經久而不歇其故何耶有根在也曰飲
曰水曰敗血是耳瘧家多蓄痰涎黃水或停滯心下
則常山能吐之或結癖脇間則常山能破其癖而下
之其有純熱無寒或蘊熱內實之證投以常山大便
點滴而下似泄不泄須用北大黃爲佐大泄數下然
後獲愈也又婦人產後敗血流經亦能令人寒熱如
瘧至暮則發發則身痛如被杖宜通經活血之劑鹿
角屑和血止痛如神。

門人

平舟沈安伯

星門陳步羔

全校字

珊 圖南

男

龍翔 召南